

VIRUELA SÍMICA VS COVID-19 PARA LOS PADRES



El riesgo de que los niños se infecten de viruela símica en la escuela es muy bajo. La mayoría de los casos de viruela símica han afectado a los adultos y se han contagiado debido al contacto cercano de piel con piel.

VIRUELA SÍMICA

¿CÓMO SE TRANSMITE?

- Contacto directo con la piel o los fluidos corporales de una persona infectada
- Contacto con objetos contaminados por el virus (como ropa o juguetes)
- Gotitas respiratorias durante un contacto prolongado de cara a cara

No se propaga fácilmente.

COVID-19

- Pequeñas gotas en el aire a través de respirando, hablando, estornudando o tosiendo.
- Se puede transmitir de personas infectadas que no tienen síntomas.

Altamente infeccioso



¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS?

- Sarpullido (puede parecer ampollas o granos) en cualquier parte del cuerpo
- Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos y fatiga

Los síntomas suelen aparecer de 1 a 3 semanas después de la exposición.

- Fiebre, tos, escalofríos, o dolor de garganta
- Pérdida del sabor o olor y falta de aire
- Dolores musculares o de cabeza
- Problemas del estomago

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición.

¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO?

- Lavarse las manos con frecuencia
- No compartir los objetos personales (ropa, bebidas, sabanas)
- Evitar el contacto con personas infectadas y materiales contaminados

- Lavarse las manos con frecuencia
- Vacunarse y ponerse la vacuna de refuerzo de COVID-19
- Utilizar una mascarilla

SI TIENEN SÍNTOMAS:

- Contacte de inmediato al proveedor médico
- Evite el contacto cercano de piel con piel con otras personas hasta que el niño haya sido examinado.
- Cubra cualquier ampolla o lesión en la piel del niño.
- Siga las recomendaciones de tratamiento del proveedor.

- Contacte al proveedor médico para obtener una prueba de COVID-19.
- Siga la guías de aislamiento si es positivo y mantenga el niño en casa.



Para más información, tómale una foto al código QR.

